



192

Lane Medical Library




Über Kriegsamennorrhoe.



Herbert Schwenger.

Halle - Wittenberg



Über Kriegssamenorrhoe.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung


der Doktorwürde in der Medizin und Chirurgie

mit Genehmigung

der hohen medizinischen Fakultät der vereinigten
Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Herbert Schwenger, approb. Arzt
aus **Bockenem a. Harz.**



Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Halle-Wittenberg.

Der Dekan:

Geh. Med. Rat Professor Dr. Schieck.

Referent: Geh. Med. Rat Prof. Dr. Sellheim.

„Retinentur menstruæ quando
totum corpus non est sanum“.

Dieses Wort aus dem Munde Pauls von Aegina zeigt uns, daß schon im Altertum die Unregelmäßigkeiten bezw. das Ausbleiben der Menfes als Krankheitsfymptome bekannt waren. Die Gefchichte der Medizin weiß durch Plinius zu berichten, daß Cornelia, die Mutter der Gracchen, wegen einer folchen Affektion operiert wurde. Auch Gallard fagt schon richtig: „L'amenorrhée eft toujours fymptomatique d'un état général ou d'une lésion locale.“ Ganz allmählich rang man fich aber erft zu einer richtigen Erkenntnis der verschiedenen Gründe für das Stillfeyn der Menfes durch. Heute wiffen wir bereits, daß wir zu trennen haben zwifchen einer organifch bedingten und einer funktionellen Amenorrhoe. Allerdings gibt es zwifchen beiden auch Übergangsformen, wo fich nicht fagen läßt, ob es fich um eine primäre Veränderung der für die Menftruation in Frage kommenden Organe handelt, oder ob diefe erft fekundär veranlaßt ift. Halten wir uns recht vor Augen: Bedingung für die Menftruation ift funktionierende Keimdrüfen und menftruationsfähige Gebärmutterfchleimhaut.

Als organifch bedingt, um auch diefe Art kurz zu ftreifen, können wir demnach die Amenorrhoe bezeichnen bei Atresien der inneren und äußeren, fowie bei Hypoplasien und Stenosen der inneren Genitalien, ferner bei Atrophien der Ovarien (auch wie allgemein bekannt, nach Zerftörung derfelben durch Röntgenbeftrahlungen,) fowie bei größeren Tumoren oder Entzündungsprozessen oder Tuberkulose der Ovarien fchließlich bei Exftirpation des Uterus oder der Ovarien fowie Zerftörung der Uterusfchleimhaut durch Curettement oder Ätzungen. Hierbei handelt es fich meift um eine dau-

ernde Amenorrhoe. Intermittierend tritt sie auf während der Gravidität und während der Laktation und kann hier als physiologisch bezeichnet werden. Den Übergang zu den funktionellen bilden die Amenorrhoeen, die auftreten bei Ernährungsstörungen, nach erschöpfenden Krankheiten (wie Ty., Anaemie, Chlorose, Tbc., Pneumonie, Pleuritis, chron. Nephritis, Diabetes, Alkoholismus und Morphinismus). Von reinfunktioneller Amenorrhoe können wir in den Fällen sprechen, wo sie im Gefolge von psychischen Alterationen, Nervenkrankheiten und Psychosen beobachtet werden. Hierher gehört die merkwürdige Erscheinung der von den Franzosen als „grossesse nerveuse“ bezeichneten Affektionen, wo bei unverheirateten weiblichen Personen, die einen moralischen Fehltritt begangen haben, aus Furcht geschwängert zu sein, oder bei verheirateten Frauen mit dem sehnüchtigen Wunsch, endlich schwanger zu sein, die Menstruation ausbleibt. Wir kommen später noch einmal auf die Ursachen der funktionellen Amenorrhoeen zurück.

Zu den mannigfachen Erscheinungen, die der große Weltkrieg mit sich brachte, gehört auch eine auffallende Zunahme der Amenorrhoeen. Kein anderer Krieg hat uns so viele Fälle der Amenorrhoe zum Studium an die Hand gegeben, wie gerade der letzte, was sich wohl aus der langen Dauer und dem völligen Umschwung der äußeren Lebensbedingungen und den einschneidenden Begleitumständen erklären läßt. Wir sehen hier von den Fällen ab, bei denen es sich um eine organische Erkrankung handelt, auch schließen wir im folgenden sämtliche Fälle aus, bei denen eine beginnende Gravidität nicht mit Sicherheit auszuschließen ist. Nicht mit eingerechnet sind auch die Fälle, wo es sich um eine Cessatio mensium von weniger als zwei Monaten, außerdem die, bei denen es sich um eine Dysmenorrhoe handelt. Es sind auch nur die Fälle herangezogen, die früher bereits menstruiert waren.

Es war erst gegen Ende des Jahres 1916, als man auf diese eigenartige Erscheinung der zunehmenden Frequenz der Amenorrhoeefälle aufmerksam wurde. Ich erinnere mich

noch lebhaft des Tages, als der verstorbenen rastlose und eifrige Förderer der Gynäkologie Johann Veit, gelegentlich Besprechungen der Graviditas incipiens von seinen Beobachtungen Mitteilung machte. Seine Wahrnehmungen sind nicht in die Öffentlichkeit gelangt, da er zu plötzlich durch den Tod entrissen wurde. Erst später war es anderen Forschern vergönnt, schriftliche Mitteilungen über die sogenannte Kriegsamennorrhoe dem Druck zu übergeben. Seitdem wurde das Interesse für diese Krankheit lebhafter und das Columbasei zog einen Schwall von literarischen Abhandlungen über Untersuchungen nach sich, unter denen sich einige besonders interessante Aufsätze befinden (- ich erwähne die Arbeiten von Siegel, Ekstein, Dietrich, Schweitzer Köhler, v. Jaworski, Ebeler, Stickel usw. -)

Bevor wir aber zu dem Wesen, der Ursache usw. der Kriegsamennorrhoe übergehen, wollen wir kurz den Begriff Kriegsamennorrhoe definieren. Wir verstehen darunter das während der Kriegszeit gehäufte Ausbleiben der regelmäßigen Genitalblutungen der Frau aus Gründen, die weder auf eine primäre Erkrankung der Genitalorgane noch Allgemeinerkrankungen (wie Diabetes, Tbc., Basidow usw.) zurückzuführen, noch physiologischer Natur sind.

Man vermutete die Ursache in Ernährungsstörungen und dadurch bedingter Entkräftung, psychischen Alterationen, starken seelischen Depressionen, Shoks, in der sexuellen Enthaltsamkeit, veränderten Lebensweise und Überanstrengung (durch die von der Frau geleistete Männerarbeit) sowie in dem von dem stärker ausgemahlenen Brotmehl ausgehenden Ergotismus. Man faßte andererseits die Kriegsamennorrhoe als eine Art Sparsystem der Natur (Siegel) oder eine Selbsthilfe des Organismus im Kampfe gegen die auch während des Krieges gehäufte Erkrankung an Tbc. (Schwer mann) auf.

Über die Zunahme der Fälle von Kriegsamennorrhoe gibt uns das reichhaltige Material der Ambulanz der Halenser Frauenklinik einen guten Überblick. Danach gestalten sich die einzelnen Jahre folgendermaßen:

1915	unter 3844 Erstkonsultationen	18 Fälle v. Krgsa.	=0,5 ⁰ / ₀
1916	" 4146	32 " " "	=0,8 ⁰ / ₀
1917	" 4093	98 " " "	=2,4 ⁰ / ₀
1918	" 5141	76 " " "	=1,5 ⁰ / ₀
1919	" 2800	19 " " "	=0,7 ⁰ / ₀

Dabei sind die letzten 5 Monate des Jahres 1914 außer Acht gelassen, weil sich in dieser Zeit keine wesentliche Zunahme der Amenorrhoe bemerkbar machte, was sich dadurch erklären läßt, daß die Frauen sich wohl weniger mit sich selbst beschäftigten und mehr an ihre Familie, an ihre ins Feld gerückten Gatten dachten und ihr eigenes Ich in dem Siegestaumel vergaßen, andererseits wohl auch bei einer Cessatio mensium an eine beginnende Gravidität glaubten. Erst das längere Stillen ohne sonstige Schwangerschaftssymptome führte auch einige von ihnen dann zum Arzt.

Die Zahlen des Jahres 1919 beziehen sich auf die Zeit vom 1. I. bis 1. X. (bis zur Fertigstellung dieser Arbeit). Wesentlich höhere Prozentzahlen konnte Ekstein feststellen. Unter 354 Neuaufnahmen vom 1. X. bis 31. XII. 1915 fanden sich 33 Fälle (9,3⁰/₀) von Amenorrhoe, davon 12 Fälle (36⁰/₀) mit negativem Genitalbefund. Vom 1. I. 16 ab waren es unter 1421 Erstkonsultationen 132 Fälle (9,1⁰/₀), davon 56 (42,1⁰/₀) ohne krankhaften Genitalbefund.

Wenn wir auch auf die Bewertung der Prozentzahlen der einzelnen Jahre später noch einmal zurückkommen müssen, so möchte ich doch gleich noch eine zweite tabellarische Übersicht folgen lassen, die uns über die Verteilung der Fälle bei Verheirateten und Ledigen, bei den verschiedenen Altersklassen und über die Dauer der Amenorrhoe Auskunft gibt.

			Alter d. Patient.			Dauer d. Amenorrhoe				ob gebor.	
			bis 25 J.	26-35 J.	über 36 J.	bis 3 Mon.	4-6 Mo.	6-12 Mon.	über 1 J.	ja	nein
Jahr	Frau	FrL.									
1915	12	6	10	7	1	5	6	7	0	11	7
1916	12	20	20	10	2	13	8	10	1	13	19
1917	54	44	50	41	7	49	25	19	5	33	65
1918	33	43	44	24	8	36	16	15	9	22	54
1919	7	12	12	6	1	8	8	1	2	6	13
Sa.	118	125	136	88	19	111	63	52	17	85	158
in %	48	52	56	36	8	46	26	21	7	35	65

Stadt und Land liefert ungefähr gleich viel Fälle.

Danach besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen Verheirateten und Unverheirateten. Am meisten betroffen sind die Altersjahre bis zu 25, ferner die Nulliparen (und zwar ca. doppelt soviel wie die Frauen, die bereits geboren haben). In den meisten Fällen dauerte die Amenorrhoe nur ca. 3 Monate. Ähnliche Prozentzahlen ergeben sich auch aus den meisten veröffentlichten Aufsätzen, sowie den Beobachtungen, die einige mir bekannte Ärzte in der Allgemeinpraxis machten. Ich glaube aber mit Robert und Gebhard die Zahl der Amenorrhoeen noch viel höher veranschlagen zu müssen. Gerade in den jüngeren Jahren ist die Amenorrhoe viel häufiger, kommt aber meist nicht in die Behandlung des Frauenarztes. Es melden sich gewöhnlich nur die schuldbewußten Mädchen krank, während die sich unschuldig fühlenden zunächst durch Hausmittel den Wiedereintritt der Menfes zu erreichen suchen und überhaupt der Sache ruhiger gegenüberstehen.

Der Grund bzw. die Beschwerden, die die Patientinnen zum Arzt führten, sind recht verschiedenartig. Bei den Verheirateten und den sich keines geschlechtlichen Verkehrs bewußten ledigen Personen waren es meist Klagen über Kopf-, Rücken-, Unterleibs- und Kreuzschmerzen. Einige klagten über Schwindel, Erbrechen, Mattigkeit, Schwäche in den Beinen, fliegende Hitze, Beklemmungen, Krämpfe und Wallungen z. Zt. der Periode, einige aber auch über Druckgefühl in den Ovariengenden. Sehr viele der Ledigen kamen um sich Gewißheit darüber zu verschaffen, ob eine Gravidität vorlag.

Eine seltsame Erfahrung machte Niemann. Zu ihm kamen Mädchen, die in einer Konservenfabrik arbeiteten, wegen Amenorrhoe in die Sprechstunde und zwar aus dem Grunde, weil sie gehört hätten, daß sie „verrückt“ würden, wenn die Menfes längere Zeit ausblieben. Vereinzelte Frauen meldeten sich auch krank wegen vicariierender Blutungen aus Nase, Zahnfleisch, Magen, Lunge und Haut; auch Bab berichtet über Fälle, wo Kriegsammenorrhoe zu menstrua-

ellem Nasenbluten führte Ueber vicariierende Exantheme (impetiginöse, herpesähnliche und akneartige) verlautet in der Kriegsliteratur leider nichts.

Im Gegensatz zu den Klagen, die recht verschiedenartig waren, waren die Untersuchungsbefunde wenig wechselnd. Die meisten Patientinnen zeigten normal gebildete und entwickelte Genitalorgane. Der Uterus war meist hühnereigroß, der Muttermund geschlossen, aber nicht stenotisiert, die Ovarien mandelgroß, höckerig, (ein Zeichen daß auch sie normal funktioniert hatten), beweglich. Auch die sekundären Geschlechtscharaktere, wie Brüste, Pubes waren größtenteils gut ausgebildet. Daneben kamen aber auch Fälle zur Beobachtung, wo die Gebärmutter atrophiert war. Die Literatur erwähnt Fälle, wo schließlich nur noch ein wallnußgroßer Uterus übrig war. Die Portio nahm meist nicht an der Atrophie teil, zuweilen wurde sie ebenso wie der supravaginale Teil der Cervix nur etwas ausgezogen gefunden. Interessante Mitteilungen macht Williams. Er fand bei Amenorrhoeischen ein mangelndes Wachstum oder ausbleibenden Zerfall der Uterus Schleimhaut. „Die Decidua bei Amenorrhoe ist außerordentlich dünn im Bereiche der ganzen Innenfläche des Uteruskörpers“. Nach seinen Untersuchungsergebnissen kann aber auch eine Decidua gebildet und ohne Blutverlust abgestoßen werden und unbeachtet bei Leukorrhoe abgehen. Pok konstatierte bei Abrasionen zu diagnostischen Zwecken bei Amenorrhoe eine starke Drüsenarmut des Uterus wie im Postmenstruum (Ruhezeit der Mukosa). Er ist sich allerdings nicht klar darüber, ob die Schleimhaut sich seit dem letzten Postmenstruum so gehalten hat, oder ob dieser Zustand sich als Charakteristikum herausgebildet hat. Ich halte diesen Befund für eine reine Inaktivitätsatrophie der Drüsen. Die Ovarien tastete der palpierende Finger vereinzelt nur als bohnen- ja erbsengroße Gebilde. Auch zur völligen Atrophie der ganzen Genitalien kam es gelegentlich bei Frauen, die früher normal menstruiert waren und normal geboren hatten.

Untersuchungen über die Bewertung der Abderhalden'

ischen Reaktion bei Amenorrhoe sind z. Zt. noch nicht abgeschlossen.

H. Köhler wies durch mannigfache Untersuchungen eine Verminderung und Lumenverengung der Ovarialgefäße nach, ferner ein Fehlen des corpus luteum, der Graaf'schen Follikel und Primordialeier. Das entspricht ja den Ausführungen Sellheims, der in seiner „Physiologie der weiblichen Genitalien“ sagt, daß experimentelle Untersuchungen, wie sie von Straßmann ausgeführt wurden (Injektion von physiologischer NaCl-Lösung, Glycerin usw. in die Ovarien), ergeben haben, daß die Vergrößerung der Follikel einen wesentlichen Einfluß auf die Menstruation hat. Köhler fand auch gelegentlich Alexander Adam'schen Operationen bei Amenorrhöischen kleinzystische Degeneration der Ovarien, Bilder, wie wir sie bei Oophoritis chronica finden, deren späteres Stadium ja auch durch konsekutive Atrophie der Ovarien zur Amenorrhoe führt. Er schließt daraus, daß es sich um Ernährungsstörungen bzw. Unterernährung mit verminderter Eiweiß- und Fettzufuhr resp. Änderung in der Zusammensetzung der Nahrungsmittel handelt. Diese Störungen zeigen sich im ganzen Organismus, sie kommen aber vor allem an den empfindlichen Ovarien zum Ausdruck. Er gibt dabei eine gewisse Prädisposition bei manchen Frauen zu. Seine Untersuchungen werden bestätigt durch Pflüger, der durch Versuche fand, daß bei jungen Katzen schon nach geringer Ernährungsstörung die Ovarien sich mit Fett inhibierten. Vaerting zieht daraus den Schluß, daß es sich bei Kriegsamorrhoe um ähnliche Verhältnisse handeln muß. Er glaubt, daß durch die mangelhafte Ernährung in den Kriegsjahren eine gewisse Follikelatresie herbeigeführt wurde. Ungeplatzte Follikel gehen in großer Zahl zu Grunde, sodaß bei längerem Anhalten der Ernährungsstörung die Gefahr der Sterilität sich nicht vermeiden läßt. Czerwenka weist an der Hand von 66 Fällen nach, daß die Hauptursache in einer Unterernährung besonders einem Mehl- und Brotmangel zu suchen ist. Eine evtl. auftretende Uterusatrophie hält er dementsprechend für eine Inanitionserscheinung.

Ebenso v. Jaworski, der direkt von einer „Amenorrhoea ex inanitione“ spricht. Im Gegensatz zu Giesecke, der keine ausgesprochene Unterernährung annimmt, sondern der veränderten, ziemlich gleichförmigen Zusammensetzung der Nahrung die Schuld beimißt. Diese Autoren stehen durchweg auf dem Standpunkt, daß es sich primär um eine Läsion der Ovarien handelt, die erst im späteren Stadium auf den Uterus übergreift. Einen auffälligen Befund erhob Ebeler in seinen Fällen von eingebildeter Schwangerschaft. Sehr oft konstatierte er das Vorhandensein von Kolostrum und hält dieses Phänomen für einen reflektorischen Vorgang über die Ovarien.

Demgegenüber macht Fischer auf die Anwesenheit von Mutterkorn im Brot infolge höherer Ausmahlung des Getreides, besonders des Roggenmehles aufmerksam. Backofen meint deshalb, daß durch die dauernde Aufnahme von Mutterkorn eine Kontraktion der Uterusgefäße herbeigeführt wird und dadurch Blutaustritte behindert werden. Er glaubt gerade durch den Ovarialbefund (Verminderung der Gefäße und verengte Lumina der noch vorhandenen) diese Theorie bestätigt zu sehen. Fischer nimmt nicht Ergotismus im toxischen Sinne bis zur konvulsiven oder gangränösen Form an, sondern nur eine Wirkung wie bei kleinen Dosen, auf die ja der Uterus als feines Reagens antwortet. Daneben vermutet er aber auch einen Einfluß der Rost- und Brand-Pilze und Raden, deren Wirkung auf den Uterus nicht hinreichend erforscht ist.

Fraenkel schob dem Ausbleiben des geregelten Geschlechtsverkehrs die Hauptschuld für die Kriegsamorrhoe zu. Diese Annahme weisen auch Abel und Stickle nicht ganz von der Hand. Bei 20 von 74 Fällen, die in Abels Behandlung kamen, war der Mann nicht zu Hause. 4 Frauen gaben an, daß nach dem Besuch des Mannes die Regel 1 bzw. 3 mal in alter Stärke aufgetreten, dann wieder ausgeblieben sei. Untersuchungen, die Schlesinger anstellte über Blutzucker- und Hämoglobingehalt haben krankhafte Abweichungen nicht erkennen lassen. Er fand nur eine ge-

wisse Labilität des Blutdruckes, die größere Schwankungen zeitigte, als bei Frauen ohne Störungen der Menfes.

Im Gegensatz zu diesen Autoren hält Schwermann die Amenorrhoe während der Kriegszeit für das erste Zeichen einer beginnenden Lungentbc. Er rät daher, falls sonst kein „faßbares“ aetiologisches Moment sich nachweisen läßt, genau auf Tbc. zu untersuchen. Er sagt wörtlich: „Diese Amenorrhoe ist eine Art Selbsthilfe des Organismus. Durch das Aufhören der Menfes schaltet er das durch die Menstruation bedingte, periodisch wiederkehrende und periodisch die Widerstandskraft des Körpers schwächende Sinken des phagozytären Index aus.“ Er ist daher der Ansicht, daß es ein schwerer Kunstfehler sein würde, wenn man die Herbeiführung der Menfes therapeutisch erzwingen wollte. Durch eine Therapie würde nicht nur die Grundkrankheit, die Tbc., beeinflußt, sondern es würde auch der Selbstschutz des Organismus im Kampfe gegen die Tbc. umgeworfen.

Ekstein zieht aus seinen bereits einige Seiten vorher niedergelegten Beobachtungen den Schluß, daß es sich bei der Kriegsamorrhoe, neben den Ernährungsstörungen wesentlich um psychische Momente (besonders Schwangerschaftsangst) sowie Ueberbelastung der weiblichen Körperkräfte und reichlichen Genuß von unreifem Obst in der Sommerzeit handelt. Er faßt daher die Amenorrhoe als ein Symptom einer allgemeinen Trophoneurose und speziell einer Trophoneurose des ganzen Genitalapparates auf.

Auch Siegel schließt sich dieser Auffassung an. Er glaubt nicht, daß die Ernährung viel bei der Entstehung mitspricht, sondern daß plötzliche psychische Eindrücke und Aufregungen sowie die erhöhte körperliche Arbeit die Hauptschuld an der Einstellung der Menstruation tragen. Kieffer's und Hilferding's Beobachtungen laufen ebendort hinaus. Gebhard sah Frauen, die auf starke psychische Erregungen (Schreck, Todesnachricht, Feuersbrunst, Eisenbahnunfälle und dergl.) ihre Regel verloren. An die länger bestehende Amenorrhoe schloß sich meist bleibende Atrophie des Uterus an. Umgekehrt berichtet Robert über einen Fall, wo ein

neun Monate lang amenorrhöisches junges Mädchen infolge Schrecks (sie sah einen Erhängten) von Stund an wieder regelmäßig menstruierte. Er machte auch die Erfahrung, daß in einzelnen Fällen, in denen eine Schwangerschaft sehnlichst herbeigewünscht wurde, die Frauen sich die bei Graviden entdeckten Beschwerden (darunter Sistieren der Menfes) suggerierten. Raciborski ergänzt hierzu, daß bei diesen Frauen, wenn sie sich von dem Fehlen der Gavidität überzeugt haben, die Regel wieder normal einsetzt. Ich nannte schon die von den Franzosen beobachtete Erscheinung der „grossesse nerveuse“ die ja auch psychischer Genese ist. Einen etwas eigenartigen Standpunkt nimmt Ebeler ein. Er sagt, daß die überwiegend größere Zahl von Amenorrhöischen durch eingebildete Schwangerschaft in diesen Zustand versetzt ist. Er teilt demnach seine Fälle direkt ein:

I. „eingebildete Schwangerschaft

II. Amenorrhoe“.

Er schreibt in seinem Aufsatz wörtlich:

„Die Täuschung bezw. Einbildung der betreffenden Patientinnen war so groß, daß sie nicht nur während der ersten Monate über ihren Zustand im Unklaren waren, sondern auch in späteren Monaten ein Stärkerwerden des Leibes und kindliches Leben verspürten; 4 mal kam es sogar vor, daß die Frauen mit der Frage kamen, ob sie trotz ihrer schon regelmäßig auftretenden Wehen noch eine dringende Beforgung machen, oder unterwegs von der Geburt überrascht werden könnten. In zwei Fällen erschien die Hebamme mit in der poliklinischen Sprechstunde, um feststellen zu lassen, wie es mit der Geburt stünde; sie sei vor einigen Stunden wegen Wehenbeginnes gerufen worden und vermute auf Grund des Untersuchungsbefundes eine pathologische Schwangerschaft bezw. eine Komplikation.“

Bekannt ist die Tatsache, daß wenn Mädchen vom Lande in die Stadt kommen und eine Stelle antreten, längere Zeit amenorrhöisch werden. Dührßen berichtet von Hebammen-
schülerinnen, die, an rein körperliche Arbeit gewöhnt, in

den Betrieb einer Frauenklinik eingeführt und gewaltsam zu geistiger Arbeit gezwungen werden, mit dem Einsetzen dieses Beschäftigungswechsels die Periode verlieren. Eulenburg's Beobachtungen gehen dahin, daß plötzlicher Schreck eine plötzliche Erregung, eine psychische Depression (Heimweh und dergl.) sogar eine im Gange befindliche Menstruation zum Stillstand bringen können und daß sich hieran eine monatelang fortdauernde *Cessatio mensium* anschließen kann.

Veränderte Lebensgewohnheiten rufen bei manchen Völkern lange Menstruationsintervalle, also vorübergehende Amenorrhoe hervor. So wird uns von Stirton mitgeteilt, daß die Grönländerinnen den Winter über amenorrhöisch sind, und daß die Weiber mancher wilden Völkerstämme Südafrikas, die ja bekanntlich die meiste eigentlich den Männern zufallende Arbeit verrichten müssen, Streifzüge, Jagden usw. mitmachen, ähnlich der Brunst mancher Tiere in langen unregelmäßigen Terminen menstruieren.

Ich glaube an Hand der Fälle der Hallenser Frauenklinik, bestätigt durch die Erfahrungen mehrerer mir nahestehenden praktischen Ärzte, mich für diese von Ekstein, Siegel, Hilferding, Gebhard, Robert und Eulenburg vertretene Theorie, (welche psychische Momente bei der Entstehung der Kriegsamorrhoe in den Vordergrund schiebt) einsetzen zu können.

Das Allgemeinbefinden der Frau ist abhängig von der Menstruation. Bei normaler Periode treten im sonst gesunden Körper weder psychische noch körperliche Störungen auf. Die Regel ist also der Reflexakt des Weibes. Jede Aenderung der normalen Blutungen (das Ausbleiben, das häufigere, stärkerz oder schwächere Auftreten derselben) macht sich auch in der Psyche des Individuums bemerkbar. Umgekehrt haben uns aber die Kriegsjahre gelehrt, daß durch psychische Alterationen die Menstruation beeinflusst wird. Sicherlich gibt es bei vielen, psychisch leicht beeinflussbaren, Frauen eine gewisse Prädisposition. Es liegt mir auch fern, den durch die Unterernährung geschaffenen locus

minoris resistentiae zu leugnen. Ich gebe auch zu, daß vereinzelte Fälle vielleicht auf eine Inanitionsatrophie der Genitalorgane zurückzuführen sind, aber in der größeren Zahl der Fälle muß man wohl Inaktivitätsatrophie annehmen. Grundsätzlich aber möchte ich feststellen, daß die Unterernährung nicht die Hauptursache sein kann, da die Land- und Stadtbevölkerung nach Siegels und meiner eigenen Statistik gleichmäßig beteiligt ist; und von ländlichen Bewohnern kann man doch wohl nicht behaupten, daß sie unter Mangel an Nahrungsmitteln zu leiden hatten. Dagegen glaube ich, daß beide Teile von psychischen Eindrücken gleichmäßig betroffen wurden. Die Aufregungen, die der Krieg mit sich brachte, die Sorgen, die sich die Frauen um das Wohlergehen ihrer Ehemänner, ihrer Bräutigame, ihrer Brüder und Söhne machten, gesteigert durch manchmal unvorsichtige Äußerungen von schweren Kämpfen usw. in Briefen, die Nachrichten über Todesfälle, Gefangennahmen und Vermißtwerden mußten einschneidend auf die Psyche der Frau wirken, was sich reflektorisch durch die Amenorrhoe wiederpiegelte. Die Statistik bestätigt das vollauf. Die Prozentzahlen der Amenorrhoe der einzelnen Jahre gehen conform mit der Schwere der einzelnen Kriegsjahre Bis Dezember 1917 (dem Jahr der meisten und schwersten Kämpfe) haben wir eine Zunahme der Amenorrhoe-fälle, während 1918 und besonders 1919 (im Jahre des „Friedens“) die Ereignisse nicht so eingreifend waren und daher die Zahl erheblich wieder abfiel. Diese Parallele läßt sich aber nicht mit der Ernährung anstellen, denn die Zeit der schlechtesten Ernährungsverhältnisse liegt zweifellos im Jahre 1916 und 1918.

Auch die bereits erwähnte und von Fränkel usw. als Ursache in den Vordergrund gehobene sexuelle Abstinenz glaube ich im Sinne meiner Annahme dahin deuten zu können, nicht daß durch den eingeleiteten Sexualverkehr, sondern überhaupt durch das Wiedersehen mit dem Gatten der Bann der Amenorrhoe gebrochen wurde und die Menstruation wieder eintrat.

Wie anders als durch psychische Einflüsse sollte man das Sistieren der Menfes bei Ortswechsel, bei Heimweh, bei plötzlichen seelischen Erregungen (Todesfällen usw.) erklären? An eine bekannte Tatsache möchte ich erinnern. Frauen, die ins Gefängnis eingeliefert sind, werden oft amenorrhöisch. Werden sie wieder entlassen, so treten die Menfes in normalem Typus wieder auf.

Die völlig veränderte Lebensweise, Wechsel des Berufs und der Beschäftigung, sowie die Überanstrengung durch die von der Frau geleistete Männerarbeit wirkten im höchsten Grade begünstigend. Von 126 durch Stickel behandelte Fälle hatten 47 den Beruf gewechselt (sie waren meist in Munitionsfabriken, als Schaffnerinnen bei der Elektrischen, Eisenbahn oder Post, oder auch in Büros tätig). 8 von ihnen gaben ausdrücklich an, daß sie reichlicher ernährt wären als zu Friedenszeiten, da sie aufs Land gezogen waren.

Ich verweise auch auf einige Fälle, die Abel in seinem Aufsatz anführt, und die ich im Original wiedergebe:

Fall 1: Frl. M. 20 Jahre alt, früher Periode regelmäßig, seit einem Jahr bei der Post, in der letzten Zeit besonders anstrengender Dienst, bemerkt seit längerer Zeit Ausbleiben der Periode. 6mal im ganzen ausgeblieben.

Fall 2: Frl. H. 29 J., früher zeitweilig ohne regelmäßige Periode, seit Kriegsbeginn Krankenpflegerin, im Felde gewesen. Periode 2mal ausgeblieben.

Fall 3: Frl. H. 18 J., früher Periode regelmäßig, seit 2 Jahren bei der Eisenbahn. Periode 8mal ausgeblieben.

Fall 4: Frl. A. 36 J., früher zeitweilige unregelmäßige Periode, durch schwere Erkrankung und seelische Aufregungen. Periode 18mal ausgeblieben.

Doebelin erwähnt zwei Fälle, die uns klar den psychischen Einfluß auf die Menstruation vor Augen führen.

Fall 5: Eine Frau von 32 Jahren, die schon 2 Tage menstruiert hatte, verlor auf die Nachricht, daß ihr Mann plötzlich gestorben sei, die Periode und trat ins Klimakterium.

Fall 6: Ein Mädchen geriet aus Ehrgeiz, den ersten Preis im Lyzeum zu gewinnen so sehr in Aufregung, daß sie, obgleich sie ihn erhielt, sofort ihre Menfes verlor und nie wiederbekam.

Nijhoff erwähnt auch Fälle, wo infolge geistiger Überanstrengung (Examenstudien) weibliche Personen amenorrhöisch wurden.

Ich kann diesen Fällen noch die Beobachtung des prakt. Arztes Dr. N. hinzufügen, der konstatieren konnte, daß von Mädchen, die weither aus Ostpreußen in eine kleine hannöversche Landstadt in eine Konservenfabrik, die viel Kriegsschachtungen hatte, zur Arbeit gekommen waren, wo also die Ernährung für die Mädchen reichlich und gut war, über 50% die Regel längere Zeit verloren und erst nach Gewöhnung wieder erhielten. Derselbe berichtet auch von Fällen von Kriegsamenorrhoe, bei Frauen, die in einem Eisenwerk (Granatendreherei) arbeiteten. Nach Aufgabe der Beschäftigung will er fast durchweg Schwinden der Amenorrhoe beobachtet haben.

Zusammenfassend können wir sagen, daß der Krieg die auslösenden Momente häufte.

Das Eintreten von Graviditäten bei Amenorrhöischen, wie sie von Siegel usw. berichtet werden, ist ein Zeichen dafür, daß die Genitalorgane des Weibes noch nicht ganz, sondern nur bis zu einem gewissen Grade ihre Tätigkeit eingestellt haben.

Ich kann hierzu noch einen Fall von Conzeption trotz Amenorrhoe aus der Hallenser Frauenklinik ergänzen:

Fall 7: Frau M. E. 21 Jahre alt, Periode früher regelmäßig, letzte Periode November 1916.

16. 5. 17. amenorrhöisch seit einem halben Jahr.

Diagnose: Kriegsamenorrhoe.

15. 11. 17 Diagnose: Gravid im sechsten Monat. Regel inzwischen nicht eingetreten.

Die Prognose der Kriegsamenorrhoe ist meist eine günstige. In der großen Mehrzahl der Fälle trat nach eingeleiteter Behandlung nach einiger Zeit die Regel wieder nor-

mal ein. Seltenerweise war die Libido und Voluptas in coitu während der Amenorrhoe nicht gestört. Anders gestaltete sich der Verlauf dort, wo es bereits zur Atrophie des Uterus resp. der ganzen Genitalorgane gekommen war. (Bei dieser Inaktivitätsatrophie handelte es sich aber im wesentlichen nur um Frauen, die länger als ein Jahr amenorrhoeisch waren). Bei ihnen erreichte nur selten die Therapie eine Besserung. Sterilität und klimakterische Beschwerden waren das Endresultat. Dies zu verhüten, muß aber bei Frauen im geschlechtsreifen Alter unsere größte Sorge sein, und bevor wir nicht den ganzen therapeutischen Wissenschatz für Amenorrhoe erschöpft haben, sollen wir uns nicht mit der Erfolglosigkeit zufrieden geben.

Schwermann, der, wie ich bereits erwähnte, die Amenorrhoe für ein Frühsympton der Tbc. hält, steht ja auf dem Standpunkt, dem Körper durch Provokation der Periode nicht die Selbsthilfe zu entziehen. Ich kann mich mit dieser Theorie nicht einverstanden erklären. Zeigt doch der Körper selbst am deutlichsten, daß er sich bei erhaltener Periode am besten befindet. Gerade der Umstand, daß bei länger dauernder Amenorrhoe progressive Atrophie des Uterus bis zur völligen Sterilität beobachtet wurde, veranlaßte Köhler u. a. m., unbedingt für eine Behandlung einzutreten. Wenn wir diese schweren Schäden bei den vielen Kriegsamenorrhoeen gerade im jugendlichen Alter (bis 25 Jahren) nicht zu vermeiden suchen, so laden wir eine schwere Schuld auf unser Gewissen. Zwar hat sich in vereinzelten Fällen gezeigt, daß auch ohne Therapie die Ovarien ihre Tätigkeit wieder aufnahmen und die Uterus Schleimhaut für die Ovulation vorbereiteten, aber wollen wir uns damit vertrösten? Schnell einsetzende Behandlung hat noch immer die besten Erfolge gezeitigt. Bab hält bereits das Herbeiführen von vikariierenden Blutungen z. Zt. der Menfes für einen großen Fortschritt bei Amenorrhoe, da er auf dem Standpunkt steht, daß es bei Retention des menstruellen Blutes zu einer gewissen Intoxikation des weiblichen Organismus kommen muß.

Die von den verschiedenen Autoren angegebenen Behandlungsarten gehen sehr auseinander; im wesentlichen sind es zwei Richtlinien, die uns dabei leiten: Eine Allgemeinbehandlung unterstützt durch individuell und symptomatisch wirkende Medikamente. Haben wir doch zugegeben, daß die Unterernährung während der Kriegszeit einen locus minoris resistentiae setzt. Daher gilt es auch hier helfend einzugreifen durch Aufbesserung der Ernährungsverhältnisse, durch Kräftigung des Organismus (leichte kräftige, nicht blähende, nicht stopfende Kost) durch Verschreiben von Zusatznahrungsmitteln (Fett, besonders auch leicht verdaulichen Eiweißes wie Milch, Eier, zartes Fleisch und von Tropen, Somatose, Sanatogen, Nutrose und dergl., soweit es bei dem Mangel an diesen Stoffen noch möglich war) durch Aufbesserung der Brotversorgung konnte schon viel erreicht werden. Straßmann glaubt, durch Darreichung von Weißbrot statt Roggenbrotes der Amenorrhoe zu steuern. Aber auch psychische Beeinflussung (Ortsveränderung, Aufgeben des neuen Berufes, Wiederherstellung der alten gewohnten Lebensweise, leichtere Arbeit) führte in manchen Fällen schon einen gewissen Erfolg herbei, der noch durch therapeutische Maßnahmen und medikamentöse Verordnungen gefestigt wurde. Giesecke und Ebeler halten die Psychotherapie für die Hauptsache. Nach ihrer Ansicht kommt es darauf an, den Frauen die Harmlosigkeit ihres Leidens klarzumachen. „Es sei nur durch die Verhältnisse des Krieges bedingt und nichts weiter als eine zweckmäßige Einrichtung der Natur dem Organismus bei der herabgesetzten Ernährung und schweren Arbeit die Kräfte zu erhalten.“ Hygienisch-diätetische Maßnahmen dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Laue Abreibungen, Bäder, besonders Salz- und Moorbäder regelmäßige (nicht übertriebene) Spaziergänge taten ihr Gutes. Insonderheit galt es aber spez. die Organe, von deren Funktion das Eintreten der Menstruation abhängt, anzugreifen. Durch heiße Scheidenspülungen, warme Sitz- und Vollbäder, heiße Fangopackungen, gymnastische Übungen

gen (wie Rumpfbeugen, -strecken, Beinbewegungen) Galvanisation, Faradisation der Genitalorgane (Kathode intrauterin Anode auf Bauchdecken, 20-50 mill. Amperes ca 10 Minuten jeden 3. Tag, ungefähr 5-30 Sitzungen) suchte man eine bessere Durchblutung der Beckenorgane und dadurch Verminderung von Stauungen und Erhöhung der Darmperistaltik zu bewirken.

Stoekel berichtete von guten Erfolgen bei Anwendung der Diathermie, die auch nichts weiter als eine Hyperaemie des Sexualapparates bezweckt. Er sah nach mehrmaliger Anwendung viele auch länger als 6 Monate dauernde Amenorrhoeen schwinden. In 18 von 22 Fällen erreichte Rieck eine Restitutio ad integrum nach Einlegen von Intrauterinstiften. (er ließ den Stift ohne Nachteile 14 Tage bis 8 Monate liegen). Nach Entfernung des Stiftes trat die Periode wieder regelmäßig von normalem Typ auf, in den meisten Fällen handelte es sich um eine Dauerheilung. Von ähnlichen Erfolgen berichtet Panecki bei Anwendung von Intrauterinfondierungen, intrauterinen Pessaren, Skarifikationen, heißen Intrauterinspülungen. Er weist auf die von Thure Brandt angegebene Methode der Schleimhautmassage des Uterus hin, die analog der Behandlung atrophischer Nasenschleimhaut angestellt wird: „Mit der intrauterin eingeführten Sonde werden Zitterbewegungen ausgeführt, wobei die gesamte Muskulatur des rechten Armes des Masseurs in eine Art Tetanus zu bringen ist“. Auf diese Weise hofft er die Schleimhaut wieder funktionsfähig zu machen. Diese gynaekologische Gymnastik wurde damals in Deutschland mit Enthusiasmus aufgenommen. Panecki berichtet von 11 Fällen, bei denen er diesen Behandlungsmodus einleitete. Nur in einem Falle hatte er keinen Erfolg zu verzeichnen, bei den anderen trat eine frappante Besserung bis zur definitiven dauernden Heilung von der Amenorrhoe ein. Allerdings muß diese Therapie lange fortgesetzt werden. Versuche von Lindemann und Orlovius bestätigen diese Erfolge. Schon das Einlegen von Glasstäbchen in den Uterus rief hypertrophische und hypersekreto-

rische Vorgänge hervor, die zu Blutungen Veranlassung gaben. Ähnliche Veränderungen konnten sie durch Injektion von Aqua dest. wie auch von Lipoid-Extrakten aus Corpus luteum und Placenta in den Uterus erzeugen. Neben diesen die Fluxion der Beckenorgane fördernden Behandlungsarten rät Raciborski die Anwendung von heißen Umschlägen auf Kreuz- und Lendengegend sowie Ansetzen von trockenen und blutigen Schröpfköpfen. Burns lobt Einreibungen des Unterleibes mit Seifenspiritus und Opium oder Applikation von Sinapismen und Terpentin auf den Bauch. Mehrere Autoren berichten von guten Erfolgen mit künstlicher Höfensonne eine Therapie, die für die Kliniken und Krankenhäuser wohl möglich ist, für den praktischen Arzt aber bei den teuren Preisen nur ein frommer Wunsch bleiben wird.

Aber auch die Tatsache, daß viele Patientinnen durch das Ausbleiben der Periode beunruhigt werden und das Wiedereintreten der Menfes sehnlichst herbeiwünschen, „da das schlechte Blut doch fort müsse“ führt uns schon, um die Psychotherapie zu unterstützen, dazu, auch innerlich, wenn auch die harmlosesten Mittel zu verabreichen. Eisen und Arsen scheinen mir dazu besonders geeignet.

Lorenz empfiehlt die Darreichung von Pil. aloeticæ ferratæ 2-3 mal täglich 1-2 Stück, oder Ferri_sulf. + Kal. carbon. als Pillen 3 mal täglich 3-5 Stück, oder Ferri reducti + Pulv. cortic. Chinæ als Pulver, 2-3 mal täglich ein Pulver, auch Kal. hypermang. 3 mal 0,05 mit Bolus alba als Pillen.

Abel empfiehlt folgende Zusammenfetzung:

Rp: Acid. arsenicosi 0,06

Oophorini 6,0

Ferri lactici 3,0

Extr. Valerian

Chin. hydrobrom aa. 2,0.

M. f. lege artis pil. Nr: 100

DS. 1 Woche 3 mal täglich eine Pille

später 3 mal täglich zwei Pillen.

Henrotay schlägt die Behandlung mit Eifenhypoder=

moklyfen vor (subkutane Injektionen von physiol. Lösung, zu der Eifenglycerophosphat gegeben wird und zwar in 500 gr.-Lösung 3,0 NaCl. und 1,0 Eifenglycerophosphat.

1 mal wöchentlich 150-250 ccm. der Lösung in die Lumbalgegend. Er sah danach überraschende Besserung.

Nordmann sah gute Erfolge von Arsen in Form der Solarsoninjektionen. Man gibt tägl. 1,0 als subkutane Injektion, setzt 2 mal wöchentlich (Mittwoch und Sonntag) aus, (oder jeden dritten Tag eine Injektion). Man verabreicht 24 Injektionen der Stärke I, 9 der Stärke II und zum Abklingen 3 der Stärke I. Damit ist die Kur beendet, die evtl. später wiederholt werden muß.

H. Köhler macht auf Yohimbin aufmerksam, das nach seinen Beobachtungen regelmäßige Menfes hervorrief, die aber profus waren, sodaß in einzelnen Fällen blutstillende Mittel gegeben werden mußten.

Als sonstige Emmenagoga werden empfohlen: Sabina, Myrrhe, Senffamen, Guajak und Kanthariden.

Auch Menolylin Güstrow hält Köhler für anwendbar und zwar 3 mal täglich 1 Tabl. zu 0,005.

Falk wandte in 48 Fällen das von Prof. Freund und Dr. Heim dargestellte und als Amenyltabletten im Handel befindliche Methylhydrastimid an: bei 19 Patientinnen (40%) trat sofort die Periode wieder regelmäßig ein (Darreichung nach seiner Vorschrift 2 mal tägl. 0,05). Bei Verdacht auf Gravidität und inkompensierten Herzfehlern ist Vorsicht geboten (bei letzteren zu 0,025 pro Dosis unter genauester Beobachtung des Herzens). Einen der von ihm erwähnten Fälle gebe ich im Original wieder:

Fall 8: Frau M. 31 Jahr alt, erste Regel mit 19 Jahren Blutung blieb 11 Monate aus, z. Zt. der erwarteten Menfes stets Kreuz- und Kopfschmerzen und Schwere in den Gliedern.

Uterus antiflektiert, mäßig groß, links hühnereigroße Hydrosalpinx. Gutes Aussehen, keine Erkrankung der Lungen. Am vierten Tag nach Verabfolgung von 2 mal tägl. 1 Tabl. Amenyl Eintritt der Blutung, dieselbe dauerte sechs Tage, mäßig stark. Nach 4 Wochen prophylaktische Verab-

reichung der Tabl. Eintritt der Menfes zur regelmäßigen Zeit

Mit der Einführung der Organtherapie in die menschliche Heilkunde trat man auch der Verwendung von Ovarialpräparaten bei Genitalerkrankungen näher.

Die Wirkung wird so erklärt, das durch Einverleibung der Hormone einer Drüse das gestörte Gleichgewicht wieder hergestellt wird, indem die eine oder andere Drüse zu stärkerer oder schwächerer Sekretion angeregt wird und auf diese Weise die Hyper- oder Hypofunktion des Ovariums durch gesteigerte Funktion der synergischen oder herabgesetzte Funktion der antagonistischen Drüsen in die richtigen Bahnen geleitet wird.

Mond, damaliger Assistent der Kieler Frauenklinik bei Prof. Werth, war es, der die Merck'sche Fabrik auf die Herstellung von Ovarialpräparaten aufmerksam machte.

Nach seinen Angaben wird die Behandlung so durchgeführt, daß in den ersten Tagen die Patientin täglich 4, später mit Ausnahme weniger Tage 6 Tabletten zu 0,5 ganzes Ovarium (als Ovariin Merck) erhält. Er sah davon gute Erfolge. Ein ähnliches Mittel haben wir in dem in der Berl. Frauenklinik von Prof. Landau erprobten Oophorin (Trockensubstanz aus Rinder- oder Schweineovarium.) Mainzer gab es als Tabletten zu 0,5 und berichtet über gute Wirkung. Tägliche Dosis 1,0 bis 5,0. Auch von seinen mitgeteilten Fällen scheint mir einer erwähnenswert, weshalb ich die Krankengeschichte hier im Original anführen möchte:

Fall 9: Frau P. K., 38 Jahre alt, seit einem Jahr unregelmäßige Periode, die oft einige Monate ausblieb. Letzte Periode vor sechs Wochen. Seit mehreren Monaten klagt P. über starken Blutandrang nach dem Kopf; zwölf bis 18 mal täglich Wallungen mit Angstgefühl und Schweiß. Schlaf dadurch häufig gestört.

Verordnung: 1,0-2,0 Oophorin täglich.

Verlauf: Die ersten 4 Tage kein Erfolg ersichtlich, dann sind die Anfälle mit einem Schlage verschwunden.

Nach drei Wochen Eintritt der Menfes. P. ist seitdem völlig beschwerdefrei.

Das auf Veranlassung von Prochownik bei Knoll in Ludwigshafen hergestellte Ovaradentriferrin (aus Ovarium und Eisen) wurde von Lau durch zweijährige Erfahrungen als wirksam befunden. Er erwähnt in einem Artikel folgenden Fall:

Fall 10: Frau M. 31 Jahre alt, seit 7 Monaten Amenorrhoe. Nach 4 Wochen langer Behandlung traten die Menfes mittelftark auf. Vier Wochen später ebenfalls. Auch Ohrenstein berichtet in 5 Fällen nach Darreichung deselben über gute Erfolge. Er sah bereits bald nach dem Gebrauch der Tabletten regelmäßig wiederkehrende monatliche Blutungen.

Ich kann, da dieses Mittel in der Hallenser Frauenklinik angewandt wurde, diesen Beobachtungen einen erfolgreichen Fall hinzufügen:

Fall 11: Fräulein A. S. 18 Jahre alt. Periode stets regelmäßig. Letzte Regel vor 8 Monaten, seitdem amenorrhöisch.

24. 10. Diagnose: Kriegs=Amenorrhoe. Blutuntersuchung nach Abderhalden: -.

Verordnung: Ovaradentriferrin.

Verlauf: 30. 10. Erste Verabreichung, 9. 11. Zweite, 18.

11. Dritte, 27. 11. Vierte, 7. 12. Fünfte, 30. 12.

Sechste. Seitdem regelmäßige Periode, die sich terminmäßig wiederholte.

Köhler fand die Erfolge der Organpräparate bei 30 Amenorrhöen durch Versuche mit Luteoglandol, Ovoglandol, Pituglandol und Enteroglandol bestätigt. In keinem von seinen Fällen versagte diese Organtherapie.

Kominski, der auf dem Standpunkt steht, daß eine große Anzahl der Amenorrhöen auf Hypofunktion des Hirnanhangs zurückzuführen ist, empfiehlt in aetiologisch nicht klaren Fällen die Anwendung von Hypophysenextrakten. Ausdrücklich sagt er, daß er in vielen Fällen gute Erfolge feststellen konnte, und daß andererseits die Anwendung bei

Mißerfolg völlig unschädlich sei. Zusammenfassend können wir sagen:

Die während des Krieges gehäuft aufgetretene Amenorrhoe (der Kürze halber Kriegsaménorrhoe genannt, ein Name, der natürlich nicht die Ätiologie kennzeichnen soll) war eine vorübergehende Erscheinung, die durch die im Kriege gehäuften auslösenden Momente (im wesentlichen psychische Alterationen akuten oder chronischen Charakters) hervorgerufen wurde. Im letzten Kriegsjahre und im ersten Jahre nach dem Kriegsende konnte bereits eine deutliche Verringerung der Erkrankungsfälle festgestellt werden. Veranlaßt wurde die Amenorrhoe wohl durch Störungen in den für den Gesamtstoffwechsel wichtigen inneren Keimdrüsen. Die Prognose war im Durchschnitt sehr günstig, nur in vereinzelten Fällen wurden ernstere Ausgänge beobachtet. Zur Beruhigung der Patientinnen, sowie zur Verhütung der progressiven Genitalatrophie mit Sterilität ist eine Therapie die neben psychischer Beeinflussung Aufbesserung der Ernährungsverhältnisse sowie Zurückführung in ruhigere Verhältnisse und Beseitigung der Familienorgen zur Aufgabe hat, angebracht, wenn nicht sogar erforderlich. Sehr gut bewährt haben sich daneben Organpräparate, die die Sekretion der inneren Drüsen anregen, sowie mechanisch-therapeutische Maßnahmen, die eine bessere Durchblutung der Beckenorgane bewirken sollen.

Zum Schluß füge ich noch die Fälle an, die mir aus der Ambulanz der Hallenser Frauenklinik zur Bearbeitung zur Verfügung standen:

Amenorrhoeefälle der Ambulanz.

Lfd. Nr.	Nr. d. Amb.	Frau oder Fr.	Alter J.	Klagen:	Letzte Regel vor:	Therapie	Bemerkung.
1915.							
1	70	Frau	25	Rücken-Leibschmerz.	3/4 Jahr	—	Bereits gebor.
2	321	Fr.	17	Kopf-Rückenschmerz	—	Tct. ferri pom.	—
3	723	Frau	25	—	3 Monat	Eisenarsen	Bereits gebor.
4	958	»	27	—	1/2 Jahr	—	—
5	1171	Fr.	21	Seitenstechen	9 Wochen	—	—
6	1555	Frau	25	Leib-Rückenschm.	9 Monat	z. inn. Klinik	—
7	1701	»	33	Leibschmerzen	5	—	6 Geburten
8	2816	»	23	Schwindelanfälle	4	Novariätabl.	Bereits gebor.
9	2858	»	28	Schmerzen im Leib	4	—	—
10	2857	Fr.	19	—	4	Novariätabl.	Kein Erfolg
11	2912	»	21	Rückenstechen	5	—	—
12	3007	»	15	Schmerzen i. r. Seite	1 Jahr	—	—
13	3039	»	16	—	3 Monat	—	—
14	3082	Frau	32	Rücken-Kopfschmerz.	1 Jahr	Diathermie	Bereits gebor. Blutg. n. 8 T.
15	3243	»	37	Schmerzen l. Seite	5 Monat	Novariätabl.	Bereits gebor.
16	3425	»	29	Schmerzen i. Seite	4	—	—
17	3548	»	30	Schwäche i. Beinen	11	Novariätabl.	—
18	3598	»	28	Leibschmerzen	4	—	—
1916.							
19	118	Fr.	21	Mattigkeit-Schwindel	3 Monat	Novariätabl.	Bereits gebor.
20	289	Frau	23	Wallungen-Kopfschm	3	—	—
21	312	»	34	Leibschmerzen	3	Novariätabl.	—
22	584	»	28	Kopfschmerzen	5	—	Bereits gebor.
23	718	»	35	—	3	—	—
24	742	»	30	Schmerzen i. Rücken	1 Jahr	—	—
25	748	Fr.	30	Schwindelanfälle	3 Monat	—	—
26	762	»	23	—	5	—	—
27	987	»	20	Leibschmerzen	8 Wochen	—	—
28	995	»	29	Magenschmerzen	4 Monat	—	Bereits gebor.
29	1073	»	19	—	14	—	—
30	1096	»	15	Rücken-Leibschmerz.	8 Wochen	—	—
31	1122	»	18	rheumat. Schmerzen	9 Monat	Pil. Blaudii	—
32	1238	Frau	28	Kopf-Rückenschmerz	8	—	Bereits gebor.
33	1389	Fr.	21	Mattigkeit	5	Pil. Blaudii	—
34	1401	Frau	39	—	3	—	n. 14 T. Menses
35	1435	Fr.	34	Kopf-Rückenschmerz.	9	Ovariin Merck	Bereits gebor.
36	1766	»	18	Kopfschmerzen	3	—	—
37	—	Frau	31	—	6	—	—
38	1847	»	37	Kopfschmerzen	7	Ov. Merck	Kein Erfolg
39	2392	Fr.	19	Mattigkeit-Schwindel	8	—	Bereits gebor.
40	2444	»	17	Kopfschmerzen	8	Ovarinum Poel	nach 2 Mon. Menses
41	2434	Frau	30	Rückenschmerzen	5	—	n. 5 Tg. Men- ses 5 Geburt.
42	2630	Fr.	23	Leibschmerzen, flie- gende Hitze	5	—	—

Lfd. Nr.	Nr. d. Amb.	Frau oder Fr.	Alter J.	Klagen:	Letzte Regel vor:	Therapie	Bemerkung.
43	2789	Fr.	14	Leibschmerzen	5 Monat	Ov. Poel 3 Inj.	—
44	2796	»	19	Kopfschmerzen	4	—	—
45	2824	Frau	30	—	4	—	Bereits gebor.
46	2891	Fr.	24	—	3	Ov. Merck	—
47	2972	»	18	—	6	Arsentriferrin	—
48	3327	Frau	23	Kopf-Leibschmerzen	3	—	Bereits gebor.
49	3567	Fr.	17	Unterleibsschmerzen	9 Wochen	—	—
50	3942	»	17	Verblödung	1 Jahr	Aufnahme	—
1917.							
51	7	Frau	28	Leibschmerzen- Schwindel	2 Jahr	Pyramidon- Ovoglandol	2 Geburten
52	14	»	33	ovariel. Beschwerden	5 Monat	Tct. valerian	—
53	26	Fr.	22	Magenbeschwerden, Rücken-Leibschmerz.	4	—	—
54	27	»	16	Kopfschmerzen	6	Ovarialextr. (Merck)	Kein Erfolg.
55	31	»	24	Unterleibsschmerzen	13	—	—
56	40	»	17	Dicke Füße	3	—	—
57	43	»	19	Unterleibs- Magen- schmerzen	3	—	1. Ovarium vergrößert.
58	47	»	20	—	2	—	—
59	197	»	17	Schmerzen in beiden Seiten	9	Arsentriferrin	Kein Erfolg
60	270	Frau	28	Stechen r. Seite	3	—	Inj. v. Ovari- alpräparat
61	336	»	44	Seitenstechen	2	—	1 Geburt
62	433	»	25	Schwindel	6	—	16 Geburten
63	463	Fr.	21	Kopf-Rückenschmerz.	4	Arsentriferrin	2 Geburten
64	522	Frau	36	Magen-Leibschmerz.	5	—	—
65	581	Fr.	17	Seitenstechen	15	—	6 Geburten
66	607	»	20	Schmerzen in Seiten u. Unterleib	8 Wochen	Aufnahme	—
67	—	Frau	33	—	5 Monat	—	—
68	693	Fr.	17	Schmerzen i. Beinen	9	—	3 Geb. 1 Abort
69	736	Frau	30	Ovarialgie	5	Pyramidon	—
70	758	»	21	Schmerz i. bd. Seiten	3	—	—
71	807	»	23	Kopfschmerzen	8	—	—
72	808	Fr.	19	—	8	—	—
73	874	»	18	Schmerzen r. Seite	5	—	—
74	1067	»	18	Leibschmerzen, Wal- lungen z. Zt. d. Per.	4	Stellgswechsel	Hypoplasie d. Genital
75	—	»	18	Kreuzschmerzen, Sei- tenstechen	8	—	—
76	1129	Frau	31	Rückenschmerzen	2	—	—
77	1151	Fr.	19	—	3	—	—
78	1156	»	23	Erbrechen, Kopfschm. Seitenstechen	5	—	—
79	1166	»	11	Seitenschmerzen	2	—	—
80	1223	»	28	Rückenschmerzen	2	—	—
81	1242	Frau	36	Brust-Kopfschmerzen	9	—	4 Geburten
82	1256	»	34	Kopfschmerzen	5	—	—
83	13.3	»	23	Schwindel b. Rücken	7	—	—

Lfd. Nr.	Nr. d. Amb.	Frau oder Fr.	Alter J.	Klagen:	Letzte Regel vor:	Therapie	Bemerkung.
84	1320	Fr.	26	Kopf-Leibschmerzen	8 Monat	—	—
85	1334	Frau	23	—	3	—	1 Geburt
86	—	Fr.	16	Masturbation	9	—	körperliche Uebungen
87	1447	Frau	26	Rückenschmerzen	6	—	—
88	1448	»	26	Kreuzschmerzen	9	—	2 Geb. 1 Abort
89	1452	»	33	Unterleibsschmerzen	3	—	—
90	1467	»	31	Schwäche, zeitw. Läh- mung der Finger	3	—	—
91	1472	»	30	Kopf-Rückenschmerz. geschwollene Füße	3	—	3 Geb. 1 Abort
92	1486	»	29	—	3	—	—
93	1508	»	33	Unterleibsschmerzen	5	—	3 Geb. 1 Abort
94	1512	»	22	Kopf-Rückenschm.	5	—	Uterus klein
95	1524	Fr.	24	—	3	—	1 Geburt
96	1528	»	23	—	3	—	—
97	1529	Frau	29	—	4	—	—
98	1502	Fr.	17	Unterleibsschmerzen	5	—	—
99	1544	»	19	—	2	—	hyst. Hinken r.
100	1577	Frau	27	Kreuzschmerzen	9	—	—
101	1580	»	25	Kreuzschmerzen	3	—	—
102	1586	»	21	—	6	—	Konzeption trotz Am.
103	1628	»	34	Unterleibsschmerzen	5	—	3 Geburten 2 Aborte
104	1660	»	24	—	3	—	Abort
105	1778	Fr.	19	—	2	—	—
106	1706	»	24	Kopfschmerzen	3	—	—
107	1712	Frau	28	Unterleibsschmerzen	2	—	2 Geburten
108	1736	»	34	Rückenschmerzen	4	—	5 Geburten
109	1951	Fr.	20	—	2	—	—
110	1917	»	18	Rückenschmerzen	4	—	—
111	2030	»	17	—	3	—	—
112	2041	Frau	36	Unterleibsschmerzen	18	—	—
113	2157	Fr.	21	Schmerzen i. l. Hüfte	13	—	—
114	—	»	1	Unterleibsschmerzen Krämpfe	4	—	—
115	2578	»	30	Unterleibsschmerzen	3	—	1 Geb. 1 Abort
116	2657	Frau	27	—	4	—	—
117	2609	Fr.	22	—	8	—	—
118	2827	Frau	32	—	4	Ovaritferrin	1 Frühgeburt
119	2881	»	38	—	3	—	5 Geburten
120	2909	»	27	—	3	—	1 Geb. 1 Abort
121	2915	»	30	—	2	—	—
122	2906	»	28	—	2	—	—
123	3022	»	21	—	12	Pulv. Liq. cmp	3 Geb. 2 Abort
124	3056	»	23	—	9	—	1 Geburt
125	3098	»	32	—	2	Ovaritferrin	1 Geburt
126	3170	»	26	—	9	—	—
127	3178	»	45	—	3	—	—
128	3186	»	34	—	15	Tct. ferri ars.	12 Geb. 4 Ab.
129	3190	»	37	Erbrechen, Schwindel	2	Ovaritferrin	2 Geburten
130	3191	Fr.	16	Rückenschmerzen	3	Tct. ferri ars.	—

Lfd. Nr.	Nr. d. Amb.	Frau oder Fr.	Alter J.	Klagen:	Letzte Regel vor:	Therapie	Bemerkung.
131	3202	Frau	35	Rückenschmerzen	4 Monat	Ovartriferrin	3 Geburten
132	3269	"	30	—	7 "	—	2 Geburten
133	3359	Fr.	20	Krämpfe, Schwindel	3 "	—	—
134	3371	Frau	27	—	3 "	—	—
135	3454	Fr.	18	—	9 "	—	geringe Gen.-Atrophie
136	3454	Frau	30	Leibschmerzen	2 "	—	—
137	3501	"	30	—	4 "	—	—
138	3502	Fr.	25	—	4 "	—	—
139	3522	Frau	34	—	10 "	—	2 Geburten
140	3585	"	31	—	5 "	—	3 Geburten
141	3619	"	28	Kreuzschmerzen, Mattigkeit	3 "	—	2 Geburten
142	3954	"	26	—	6 "	—	1 Geburt
143	3960	"	34	Schwindel, Kopf- u. Rückenschmerzen	2 "	—	—
144	3973	Fr.	21	—	4 "	—	1 Geburt
145	3980	Frau	26	—	3 "	—	—
146	—	Fr.	18	Unterleibschmerzen	9 "	—	—
147	4 56	"	28	Unterleibschmerzen	2 "	—	—
148	4074	"	22	—	6 "	—	—
1918.							
149	34	Fr.	21	—	5 "	—	—
150	85	"	18	Magen- Kopfschmerz.	15 "	Ovartriferrin	—
151	111	"	20	Rückenschmerzen	16 "	—	—
152	113	Frau	24	Mattigkeit, Ohnmacht	3 "	Tct. ferri ars.	n 44 Tg. Mens.
153	123	"	28	—	4 "	—	3 Geburten
154	127	"	38	Magen- Hüftschmerz.	15 "	—	5 Geb. 1 Abort
155	149	"	28	Kopfschmerzen	3 "	—	—
156	166	Fr.	21	—	6 "	Ovartriferrin	—
157	—	Frau	28	ovariclle Beschwerd.	3 "	" + Nervina	2 Geb. kein
158	225	"	27	—	9 "	—	—
159	240	Fr.	17	Kreuzschm. Mattigk.	9 "	Ovartriferrin	—
160	263	Frau	28	—	9 "	—	2 Geburten
161	282	Fr.	25	—	6 "	—	1 Geburt
162	422	Frau	24	—	9 "	—	—
163	426	"	2	Seitenschmerzen	2 "	Ovartriferrin	—
164	463	Fr.	18	Unterleibschmerzen	3 "	—	—
165	589	Frau	23	Rücken-, Kreuzschm.	3 "	—	2 Geburten
166	654	"	37	—	6 "	—	Uterus klein
167	728	Fr.	20	—	12 "	—	—
168	883	Frau	38	Druck, Brechreiz	6 "	—	8 Geburten
169	935	"	32	Unterleibschmerzen	3 "	—	—
170	955	"	32	Kreuzschmerzen	4 "	—	6 Geburten
171	983	"	2	Magen-, Brustschmz.	2 "	—	3 Geburten
172	1036	Fr.	21	—	6 "	—	—
173	1037	"	22	Unterleibschmerzen	2 "	Sitzbäder	—
174	1123	"	17	Unterleibschmerzen	15 "	—	—
175	1150	"	17	Allg. Körperschwäche	2 "	Ovartriferrin	—
176	1215	Frau	28	—	9 "	—	—
177	1262	Fr.	27	—	12 "	—	1 Geburt
178	1288	Frau	28	—	9 "	Tct. am aa 20	Uterus klein

Lfd. Nr.	Nr. d. Amb.	Frau oder Fr.	Alter J.	Klagen:	Letzte Regel vor:	Therapie	Bemerkung.
179	1318	Frau	37	Unterleibschmerzen K ilte, Druckgefühl	3 Monat	Tct. am aa 20	4 Geb. 3 Abort
180	1362	Fr.	22	—	9 "	Ovartriferrin	—
181	1364	"	18	—	2 "	—	—
182	1436	Frau	28	Magenschmerzen	2 "	Tct. val + Tct am aa 20. 0.	Uterus klein
183	1442	Fr.	26	—	3 "	—	—
184	1443	Frau	36	Leibschmerzen	12 "	—	vitium cordis
185	1468	Fr.	18	—	24 "	—	—
186	1515	Frau	40	—	10 Wochen	—	4 Geb. 2 Abort
187	1590	"	26	Unterleibschmerzen	3 Monat	Ovartriferrin	—
188	1591	Fr.	16	—	3 "	—	—
189	1621	"	17	—	4 "	—	Uterus klein
190	1697	"	18	Unterleibsschmerzen Stechen r. Seite	9 "	—	—
191	1725	"	19	Krämpfe, Übelkeit	12 "	Ovartriferrin	Uterus klein
192	1797	Frau	27	—	2 "	—	—
193	1815	Fr.	17	Molimina pu bertatis	2 "	—	—
194	1828	Frau	28	—	3 "	—	4 Geburten
195	1835	"	39	—	3 "	—	4 Geburten
196	1918	Fr.	23	Unterleibsschmerzen Mattigkeit	8 "	Tct. val. + Tct am aa 20. 0.	Uterus klein
197	1928	"	21	Appetitmangel, Kältegefühl	8 Wochen	Ovartriferrin	—
198	1943	"	25	Unterleibsschmerzen	15 Monat	Sitzbäder w. Leibwickel	—
199	1961	"	27	Magen- Rückenschm.	5 "	Ovartriferrin	—
200	3416	Frau	22	Leib- Rückenschm.	3 "	—	—
201	3461	—	38	Mattigkeit, Rücken- schmerzen	10 Wochen	Tct. val. + Tct am aa 20. 0.	6 Geb. 3 Abort
202	3550	—	32	" Kopfschmerzen	4 Monat	—	5 Geb. 1 Abort
203	3599	Fr.	20	—	3 "	—	—
204	3639	"	21	Rückenschmerzen	8 Wochen	—	—
205	3642	"	17	—	3 Monat	—	—
206	3706	Frau	20	Unterleibschmerzen	4 "	—	1 Geburt
207	3976	Fr.	18	" Rückenschm.	21 "	Ovartriferrin	—
208	3979	"	15	—	3 "	—	—
209	4086	"	18	—	5 "	—	—
210	4100	"	20	Unterleibsschmerzen Ohnmachtsanfälle	9 "	Kamillsitzbäd.	Uterus klein
211	4216	"	21	—	2 "	—	—
212	4213	"	31	Unterleibsschmerzen	10 Wochen	Tct. val. X Tct am aa. 20. 0.	—
213	4264	"	20	" links	3 Monat	—	—
214	4285	"	27	" rechts	21 "	—	Ut. hypoplast.
215	4346	"	28	" links	3 "	Ovartriferrin	—
216	4365	"	16	—	3 "	—	—
217	4408	"	18	—	8 "	—	—
218	4438	Frau	29	—	28 "	Ovartriferrin	2 Geburten
219	4453	Fr.	17	Seitenschmerzen	3 "	—	—
220	4479	"	17	—	3 "	—	—
221	4536	Frau	24	Kreuz-Seitenschmerz.	2 "	—	—
222	4768	Fr.	21	Schmerzen i. Beinen	4 "	—	—

Lfd. Nr.	Nr. d. Amb.	Frau oder Fr.	Alter J.	Klagen:	Letzte Regel vor:	Therapie	Bemerkung.
223	4835	Frau	32	Rückenschmerzen	4 Monat	Tct. val. + Tct. am. aa. 20. 0.	—
224	4936	"	33	Brechreiz-Magschm.	5 "	—	3 Geburten
1919.							
225	99	Fr.	23	Rücken-Seitenschm.	4 "	—	1 Geburt
226	215	"	35	—	3 "	Ovaradentrif.	—
227	218	Frau	28	Leib-Magenschm.	15 "	—	3 Geburten
228	249	"	24	—	4 "	Ovaradentrif.	Atrophia uteri
229	338	Fr.	18	Rückenschmerzen	4 "	Ovoglandol 3 Inj.	3 Geb. 3 Abort
230	467	Frau	29	Kopfschmerz, Durchf.	5 "	—	2 Geburten
231	504	Fr.	22	—	2 "	—	—
232	751	"	21	Unterleibsschm. links	5 "	—	—
233	902	"	24	—	3 "	—	—
234	1006	"	23	—	12 "	Ophorin	n. 10 T. Menses
235	1065	Frau	40	—	6 "	Tct. val + Tct. am. aa. 20. 0.	6 Geburten
236	1098	"	25	—	3 "	—	—
237	1533	"	31	—	3 "	Ovaradentrif.	Aufnahme
238	1554	Fr.	32	Kreuz-Unterleibschm.	3 "	Tct. val. + Tct. am. an. 20. 0.	—
239	1908	"	16	Leibschm. Druckgef.	22 Wochen	NovariMerck.	—
240	2389	"	26	—	4 Monat	—	—
241	2179	Frau	29	—	17 "	Ichtholzäpfch.	1 Geburt
242	2445	Fr.	21	—	3 "	—	—
243	2800	"	12	Rückenschmerzen	2 "	—	—

Literatur.

1. Abel, Amenorrhoe und Krieg. Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 15. Jahrgang. (1918.) Nr. 23.
2. Amenorrhoe, Centralblatt f. Gynaekol. 1902. Seite 1432 ff.
3. Bab, Ueber menstruelles Nafenbluten und organotherapeut. Behandlung Münch. med. Wochenschr. 1917, Nr. 46.
4. Baldy, An American Text-Book of Gynecology Philadelphia 1834.
5. Burns, Amenorrhoe. Handb. der Geburtshilfe Bonn 1834.
6. Czerwenka, -Wien. Ueber Kriegsamorrhoe, Centralbl. f. Gyn. 1917 Nr. 52.
7. Dietrich, Ueber Kriegsamorrhoe. C. f. Gyn. 1917 Nr. 5.
8. Doeblin, Die Amenorrhoe und ihre Behandlung mit Elektrizität. Inaugural-Diff. Berlin 1894.
9. Ebeler, Zur Kriegsamorrhoe. Z. f. Gyn. 1917 Nr. 28.
10. Ekstein, Ueber erworbene Amenorrhoe. Z. f. Gyn. 1917 Nr. 14.
11. Eulenburg, Amenorrhoe. Realencyklopädie der gesamten Heilkunde. Urban u. Schwarzenberg 1907.
12. Falk, Amenyl, ein neues Emmenagogum. Therapeut. Monatshefte Nov. 1909.
13. Fehling, Amenorrhoe. Handbuch der Frauenkrankheiten Stuttgart 1906.
14. Fischer, Zur Kriegsamorrhoe. Z. f. Gyn. 1917 Nr. 41.
15. Gattorno, Zur gymnastischen Behandlung der Am. Z. f. Gyn. 1892.
16. Gebhard, Menstruation und Amenorrhoe. Handbuch der Gyn. v. Veit.
17. Giesecke, Zur Kriegsamorrhoe, Z. f. Gyn. 1917 Nr. 35.
18. Graefe, Ueber Kriegsamorrhoe. Münch. med. Wochenschr. 1917 Nr. 8.
19. Hannes, Kriegsamorrhoe. Deutsch. Med. Wochenschr. 1917 Nr. 32.
20. Henrotay, Behandlung der Amenorrhoe mittels Eisenhypodermoklysen. Z. f. Gyn. 1902 Seite 1231.
21. Hilferding, -Königsberg, Zur Statistik der Amenorrhoe. Wiener med. Wochenschrift. 1917 Nr. 27.
22. Hofmeier, Amenorrhoe in seinem Handb. d. Frauenkr. Leipzig 1901.
23. Jackesch, Menstruationsanomalien. Med. Wandervorträge, Berlin 1891. Heft 25.
24. Jaworski, Amenorrhoe. Jahresbericht der Geburtshilfe u. Gyn. Franz und Veit Wiesbaden 1917.
25. Kieffer, Ueber primäre funktionelle Amenorrhoe Inaugural-Diff. Strassburg 1900 Z. f. Gyn. 1902 Seite 679.

Für die Überlassung der Arbeit sowie für die Übernahme des Referates sage ich Herrn Geh. Med. Rat Prof. Dr. Sellheim meinen verbindlichsten Dank. Gleichfalls danke ich Herrn Dr. med. Niemann sowie Herrn Dr. med. Nordmann für die Mitteilung ihrer Beobachtungen über Kriegsamenorrhoe in der Allgemeinpraxis.

Lebenslauf.

Herbert Schwenger, Sohn des Kaufmanns Karl Schwenger zu Bockenem a. Harz, wurde geboren am 11. Juni 1892 zu Bockenem, Prov. Hannover, Königreich Preußen, ev.-luth. Konfession. Nach Absolvierung der Bürger- und Mittelschule meiner Heimatstadt besuchte ich das Andreas-Realgymnasium zu Hildesheim, an dem ich am 8. Februar 1912 die Reifeprüfung bestand. Ostern 1912 bezog ich als Student der Medizin die Universität Marburg a. Lahn, wo ich am 25. Juli 1914 die ärztliche Vorprüfung ablegte. 6 Semester studierte ich in Marburg, die letzten 4 Semester in Halle a. Saale, wo ich am 3. Oktober 1919 nach bestandener ärztlicher Prüfung die Approbation erlangte und am 9. Oktober 1919 das Colloquium bestand.

(Am 15. August 1914 trat ich als Kriegsfreiwilliger beim Militär ein und war zuerst als Sanitätsunteroffizier und von Oktober 1915 bis zum Kriegsende als Feldunter- resp. -hilfsarzt im Felde tätig. Am 20. Dezember 1918 wurde ich vom Militär entlassen).

Während meiner Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen und Kliniken

in Marburg von: v. Auwers, Fries, Gasser, Göppert, Hohmeyer, Hürter, Korschelt, Kutscher, Lohmann, Mannkopff, Meyer, Richarz, Schenk, Tuzcek, Veit, Zinke.

in Halle von: Anton, Beneke, Denker, Eisler, Groß, Grouven, Schieck, A. Schmidt, P. Schmidt, Schmieden, Schulz, Sellheim, Stoeltzner, Veit, Vollhard, Winternitz.

Diesen meinen verehrten Lehrern spreche ich auch an dieser Stelle meinen Dank aus.

